

## Inrichtingscategorien Boeren voor Bijen + bijbehorend beheer

februari 2018



Inrichtingscategorien	Voorbeeldsoorten	Locatiekenmerken	Kernprincipes aanleg en beheer
Bloemen (meerjarig - zon) 100% bloemen	Biezenknoppen, geelgroene zegge, rietorchis, watermunt, gele lis, gevleugel hertshooi, koekoeksbloem, dotterbloem, ratelaar, melkeppe, wederik, moerasrolklaver, kattenstaart, blauwe zegge, heelblaadjes	Zonnige plek , vochtige, voedselarme bodem op veen, zand of klei/zavel.	Eerste jaar (aug/ sept) inzaaien met bloemrijk mengsel en 2e jaar (okt) doorzaaien met ratelaar. Daarna zou het met extensief beheer en 2 x pj (na bloei & okt) maaien en afruimen in stand gehouden moeten kunnen worden.
Bloemen (meerjarig - schaduw) 100% bloemen	Akkerkool, bosandoorn, dagkoekoeksbloem, fluitenkruid geel nagelkruid, kaardnbol, Look zonder look, ruig klokje, stinkende gouwe, wilde akelei, vingerhoedskruid, wilgenroosje	Schaduw plek, vochtig en humusrijke bodem op zand, veen of klei/zavel	Eerste jaar (aug/ sept) inzaaien met bloemrijk mengsel en 2e jaar (okt) doorzaaien met ratelaar. Daarna zou het met extensief beheer en 1 x pj (okt) maaien en afruimen in stand gehouden moeten kunnen worden. Naar eigen inzicht kan ook 1xper 2 jaar worden gemaaid en afgevoerd.
Bloemen (eenjarig) 100% bloemen	korenbloem, gele ganzenbloem, klaproos, borage, phacelia, echte kamille, grijskruid, koekruid, reukloze kamille, smalle wikke, witte krodde, slofhak	Grondsoort bij voorkeur zand of klei/zavel en minder op veen	Jaarlijks begin oktober / in het voorjaar inzaaien met bloemrijk mengsel en voor de winter maaien en afruimen. Uitgebloeid gewas winter over laten staan is ook mogelijk.
Kruidenrijke slootkant 100% kruiden	Biezenknoppen, watermunt, gele lis, gevleugel hertshooi, echte koekoeksbloem, ratelaar, melkeppe, moerasrolklaver, kattenstaart, heelblaadjes	Slootkant, grondsoort zand, klei of veen	Eerste 2 jaar (okt) doorzaaien met ratelaar (en meezaaisoorten). Daarna zou het met extensief beheer en 1 x pj (okt) maaien en afruimen in stand gehouden moeten kunnen worden. Indien beter te combineren met agrarische werkzaamheden kan dit ook meegemaaid worden met de laatste snee gras of door begrazing van droog- en jongvee.
Kruidenrijk grasland 50% grassen/ 50% kruiden	Knoopkruid, duizendblad, gewone rolklaver, brunel, kleine ratelaar, glad walstro, witte klaver	Grasland, grondsoort zand, klei of veen	Eerste jaar (aug/ sept) inzaaien met kruiden- of bloemrijk mengsel en 2e jaar (okt) doorzaaien met ratelaar. Daarna zou het met extensief beheer en 2 x pj (na bloei & okt) maaien en afruimen in stand gehouden moeten kunnen worden.
Klaverweides	Rode en witte klavers	Grasland, grondsoort zand, klei of veen	In eerste en derde jaar doorzaaien tussen half april en 15 september. Daarna zou het zichzelf in stand moeten kunnen houden. Terughoudend bemesten.
Drachtstruiken	Lijsterbes, sleedoorn, meidoorn	Bij voorkeur zonnige strook of plek en kan op alle bodems	Aanplanten en daarna af en toe naar wens in vorm snoeien.
(Fruit)bomen	Wilgen, diverse fruitbomen (sowieso: laagfruit, laagstam en middelhoge fruitbomen)	Voldoende zonlicht en bij voorkeur op kleiige, leemhoudende bodem, Minder goed op schrale zandbodems en veenbodems, maar vaak zijn deze laatste rond het erf min of meer verrijkt	Aanplanten en daarna af en toe naar wens in vorm snoeien.
Oeverplanten	Dotterbloem, koekoeksbloem, kattenstaart	Bij voorkeur zonnige oever of plek en kan op alle bodems	Aanplant vanaf 1 mei. De oever zichzelf verder laten ontwikkelen door bij weidegang tussen half maart en half augustus uit te rasteren. Vanaf half augustus kan men wel naweiden. 1 x per jaar (okt) maaien en afruimen.
Bijenhotel/ -verblijf	Zandhoop, kale grond, bijenhotel	Zonnige plek nabij bloemrijke plek	<a href="http://zie www.bijenlandschap.nl">zie www.bijenlandschap.nl</a>